アルノデ其種名ガ起テ居ル、羽狀ノ葉脈ガ射出シテ居ル有樣ハ羊齒トハ一寸思ヘナイ、所屬ハりうびんたい科デアルノデ其胞子囊叢モ一風變テ居テ所謂 Synangia ガ側脈ト側脈トノ間ニ不規則ナ二列ヲナシテ網目ノ交叉點ニ着生スル、此一ツノ「シナンギウム」ハ略圓盤形デ十數箇ノ室ガ菊座形ヲナシテ排列シ各室ノ頂部ニ孔ガアッテ胞子ヲ吐ク樣ニナッテ居ル

○臺灣蘭科植物譜

正宗嚴敬

にほひらん (Haraella odorata Kudo.)

蘭科植物ハ顯花植物中デ最モ種類ノ多イ者デアッテ全世界ニ產スル品種ハ三萬種ヲ下ラナイ、其ノ中本邦ニ產スル者ハ四五百種デアルカラ餘リ大イ方デハナイ、此ノ科ノ者ハ其ノ花ノ形態及ビ其ノ葉ノ樣子ガ優美ナノデ園藝品トシテノ大イニ價値ガアルノデ此ノ方面デ非常ニ珍重サレテ居ル、今此處ニ本誌ノ餘白ヲ借リテ其ノ寫眞ニ簡單ナ說明ヲ加ヘテ出ス事ニシタ

一、にほひらん (Haraella odorata Kudo)

臺灣北部ノ照葉樹林中ニ產スル着生蘭デアルガ、ソウヤタラニアル者デハナイ、莖ハ短ク、葉ハ二列デ密生シ倒披針狀鎌形デ葉脈ヨリ可ナリ長イ花序ヲ出シテ一乃至二花ヲ着ケル、花ハまつらん屬 (Gastrochilus) ニ

似テ居ルガ其ノ唇瓣ニ嚢ガナイ點デ之レト異ッテ居ル、唇瓣ヲ除イタ花被ハ全部黄綠色デアルガ唇瓣ノ中央ガ紫色デアル

二、ありさんえびね (Calanthe arisanensis Hay.)



ありさんえびね (Calanthe arisanensis Hay.)

臺灣ニ於テハ可ナリニ廣ク分布シテ居ルえびねノ一種デ、花ハ白色、花瓣及萼片ノ先端ハ頗ル尖ッテ居リ、距ハ他ノえびねニ比較シテ餘リ長クナイ、地生蘭デ照葉樹林ノ下草トシテ生育シ又園藝品トシテ一顧ノ價値アル者デアル

三、すげらん (Cyperorchis Babae Kudo)

此ノすげらん屬ノ植物ハ未ダ本邦ニ産スル事ガ知ラレテ居ナカッタノデアルガ臺灣産ト稱スル者ヲ先年臺北市ノ馬場氏ガ得ラレ其ヲ臺北帝國大學故工藤祐舜博士ガ研究サレ一新種ト認テ前記ノ學名ヲツケ未發表ノママ他



すげらん (Cyperorchis Babae Kudo)

界サレタモノデアル、此ノ屬ハかんらん屬 (Cymbidium) ニヨク似テ居ルガ其ノ花序ガ下垂スルノト其ノ花ハ鐘狀ヲナシテ居テかんらんノ樣ニ展開シナイ點トデ異テ居ルガ學者ニヨッテハ此ヲ一屬ニシテシマフ人モアル、元來蘭科植物ハ他ノ科ノ者以上ニ多種多樣ナ花形ヲ呈シテ居ルノデ花ニ重キヲオク現代ノ分類學者ハ此ノ科ニ非常ニ多クノ屬ヲ造リ且此ヲ認メテ居ルガ蘭ノ培養者ニヨッテ行ハレル交配ガ、分類學者ニヨッテ可

すげらん (Cyperorchis Babae Kudo)

林下ニ生ズル地生蘭ノ一種デ花ハ紫褐色ノ者ト帶綠色ノ者トノ二種ガアッテ各品種ト考ヘラレルノデ、ソレゾナリ緣ノ遠イモノト考ヘラレテ居ル者トノ間ニ行ハレル事ヨリ考ヘルト此ノ科ニ於テ餘リニ屬ヲ分ケスギテヰルノデハナイカト思ハレル、故ニ本屬ナドモ當然Cymbidium ニ合同サルベキ者カトモ考ヘラレル

四、ながばそしん (Cymbidium lineare Yam.)

臺灣北部ノ照葉樹



むらさきながばそしん (Cymbidium linearisepalum YAMAM. f. atropurpureum YAMAM.)

レむらさきながばそしん(f. atropurpurea YAM.)みどりながばそしん(f. atrovirens YAM.)ノ名稱ガ與ヘラレテ居ル、此ノ種



むらさきながばそしん (Cymbidium linearisepalum YAMAM. f. atropurpureum YAMAM.)

ハ其ノ學名ノ示ス樣ニ萼ガ非常ニ長イノヲ特徴トシテ居ル

五、まつばらん (Holcoglossum quasipinifolium SCHLT.)

此ハ主トシテ臺灣ノ針葉樹林ニ生ズル着生蘭デ又臺灣特産ノ屬ノ一

まつばらん (Holcoglossum quasipinifolium Schlt.)

ツデアル、花ハ白色デ桃色ヲ帶ビ、距ハ大キク且長イ、併シ全體ノ形ハかうとうらん (Saccolabium) ニ似テ居ルガ其花序纖細デ上方ニ向キ一又ハ二三花ヲ着ケルノミデアル（此處ニ掲ゲタ寫眞ハ臺北植物園ノ吉田氏ノ寫ス所、茲ニ氏ノ好意ヲ謝ス）

○植物妖怪漫話（其三）

久内清孝

珍形ヲ呈スル苹果

世間ノ一般人士ヲ捕ヘテ苹果ハ果實デナイナドヽ言ッタラオ前ヘハ氣ガ違ッテ居ルト叱ラレル位ナラマダヨイガ場合ニヨッテハ毆ラレルカモ知レナイ事程左樣ニ苹果ハ世人カラ果實視サレテ居ルノニ學者ハコレヲ僞果ダトカ擬果ダナドヽ云ッテ居ルコトハ中學生モ既ニ之ヲ知ルト云ヘマス、實ニ學者ハ非